

OISEAUX DES PLAINES ET ZONES AGRICOLES



© Alain Gagne

TARIER PÂTRE

On observe souvent le Tarier pâtre posé à découvert à divers endroits. Vivant en couple les deux partenaires ne s'éloignent jamais l'un de l'autre. Même en dehors de la période de reproduction ils ne s'éloignent jamais de plus de 50m.

Observation : Avril à septembre. Zone ouverte /agricole.



© Alain Gagne

CHEVÊCHE D'ATHÉNA

Ce petit rapace nocturne ne peut se confondre avec aucun autre en France. Avec ses mimiques amusantes et ses yeux dorés il laisse rarement indifférent. Cette chouette se reproduit dans des cavités diverses qui sont proposées par le mâle et adoptées par la femelle.

Observation : Toute l'année. Possible de la voir en plein jour perchée ou de l'entendre la nuit. Zone agricole.



© Anthony Maire

EFFRAIE DES CLOCHERS

Comme la plupart des rapaces nocturnes cette chouette possède un vol remarquablement silencieux. Culturellement l'effraie des clochers n'a pas toujours eu une bonne réputation. Elle a été considérée selon certaines croyances comme une créature démoniaque. Aujourd'hui la perception de ce rapace nocturne est bien meilleure et l'effraie se retrouve souvent dans des bâtis en milieu agricole.

Observation : Toute l'année. Très discrète. Possible de l'entendre la nuit. Zone agricole.



© Alain Gagne

MILAN NOIR

Ce migrateur arrive en France à la mi-mars, il restera en France quelques mois pour se reproduire. On l'observe souvent en chasse sur les champs fraîchement fauchés ou labourés à la recherche de toutes sortes de proies que la charrue a mis à découvert. Il est reconnaissable en vol à l'échancrure de sa queue.

Observation : Avril à Juillet. En vol.




© Etienne Dupoux

BRUANT ZIZI

Le Bruant zizi est un petit passereau que l'on retrouve souvent dans les zones agricoles. Oiseau un peu méfiant il arrive parfois de l'observer chantant perché sur un arbuste mais la plupart du temps il restera tapi dans le feuillage.

Observation : Toute l'année (mais surtout de février à octobre). Identifiable au chant, zone agricole.



BUSE VARIABLE

La buse se nourrit de petits mammifères qu'elle capture après les avoir localisés grâce à sa vue perçante. Elle est facilement reconnaissable à sa silhouette en vol lorsqu'elle plane pendant des heures.

Observation : Toute l'année. Identifiable en vol.



© Thomas Cugnod

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR

La pie-grièche écorcheur se retrouve en milieu agricole du fait des deux caractéristiques indispensables que doit lui procurer son habitat. Il lui faut des espaces ouverts pour chasser, présentant également des arbustes ou buissons touffus. Ses proies sont majoritairement de gros insectes. Lorsque la nourriture est abondante la pie-grièche se constitue des réserves en empalant ses proies non-consommées sur une épine ou un fil barbelé en prévision de jours à la météo moins clémente où la nourriture se fait rare.

Observation : Mai à septembre. Milieux ouverts, buissons bas épineux



FAUCON CRÉCERELLE

Le faucon crécerelle est un petit rapace. Vivant en couple pendant la période de reproduction il défend son territoire avec ferveur. Ce faucon pratique un vol qui lui est caractéristique stationnaire où il bat des ailes très rapidement et que l'on nomme "le vol du Saint-Esprit".

Observation : Février à novembre. Très reconnaissable en vol, milieux ouverts.



© Alain Gagne

HIRONDELLE RUSTIQUE

L'Hirondelle rustique est exclusivement insectivore et capture ses proies en vol. Ne craignant pas l'homme elle niche souvent dans des bâtiments dans un nid constitué de boue qui pourra être utilisé plusieurs années !

Observation : Mars à septembre. En vol en zone agricole. Perchées sur des câbles téléphoniques.



© Emile Barbelette

VANNEAU HUPPÉ

Les vanneaux huppés sont des oiseaux limicoles. En hiver ils se regroupent en grande troupes bruyantes sur des zones ouvertes en particulier des terres arables et des marais côtiers.

Observation : Toute l'année. Plaine agricole

CONTACT ET INFORMATIONS :

isere@lpo.fr
<https://www.meylan.fr/>