

Clé de détermination des pontes d'Amphibiens

Œufs isolés → Quand ? → **Pondus dès fin février** → Vu de près... → Œuf fixé sur une feuille aquatique repliée sur elle-même. **Triton palmé**
Presque impossible de les voir... Nous ne les rechercherons pas !

Œufs en cordon → Quand ? → **Pondus dès fin février** → Vu de loin... → Œufs alternés sur 3 ou 4 rangs accrochés à la végétation aquatiques, parfois sur une longueur de plusieurs mètres.

Crapaud Commun



Photo : Anaëlle Atamaniuk

Œufs en amas gélatineux → Quand ? → **Pondus de février à avril** → Vu de près... → Œufs de couleur brun foncé → Vu de loin... → ponte globuleuse isolé en en petit groupe pouvant flotter ou être déposé au fond des eaux peu profondes **Grenouilles « brunes »**

Œufs en amas gélatineux → Quand ? → **Pondus d'avril à juin** → Vu de près... → Œufs Brun-jaunâtre → Vu de loin... → ponte assez flasque, souvent recouverte d'algues **Grenouille verte**



Photo : Sébastien Blaches

Pas d'œufs ! directement des larves ... → Quand ? → **Naissance dès mars** → Vu de près... → Larves aquatiques ressemblant à une forme d'un petit « lézard sombre » avec une tache blanche ou jaunâtre à la base des 4 membres

Salamandre tachetée



Photo : Alexandre ROUX

Sources : Identifier les œufs et les larves des amphibiens de France – Claude MIAUD et Jean MURATET – INRA éditions (livre disponible en consultation et en prêt au Cine)

Photos : LPO Isère

Conception : CINE—Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Meylan—Mars 2021